

CUADRO ÁRBOLES FRUTALES

ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	POLINIZA CON	RECOLECCIÓN	CALIBRE	PODA
<i>ACEROLO</i> <i>Crataegus azar olus</i>	Rojo o blanco. 10 gr. Sabor aromático y agradable.		Octubre- Noviembre	Redondo	Invierno chupones.
<i>ALBARICOQUERO</i> <i>Armeniaca vulgaris</i>	Naranja. Prefiere zonas cálidas o semi-cálidas.	Autofértil	15 Julio	Grande	Septiembre-Octubre/ Marzo-Abril
<i>ALMENDRO</i> <i>Amygdalus communis</i>	Especie más rústica de los frutales. Fruto duro.	Autofértil · Guara · Ayles · Moncayo	Septiembre- Octubre	Medio	Primavera formación.
<i>AVELLANO</i> <i>Corylus avellana</i>	Requiere alta higrometría y pluviometría.	Negreta Fértil de coutard. Común de Reus Grifoll.	Septiembre-Octubre	Largo	Febrero chupones.
<i>AZUFAIFO</i> <i>Zizyphus vulgaris</i>	Fruto del tamaño de la aceituna. De color rojizo y sabor agridulce grato. 15 gr.		Octubre	Bueno	Invierno chupones.
<i>CASTAÑO</i> <i>Castanea sativa</i>	Exige suelos ácidos. Injertos resistentes a "TINTA".		15 Septiembre	Achatado	Invierno formación.
<i>CASTAÑO</i> <i>EDERRA</i>	Fruto grueso.	Varios	Septiembre-Octubre	Gruesa. 18-20 gr.	Invierno formación.
<i>CEREZO</i> <i>AMBRUNESA</i>	Fruto grueso rojizo. Picota sin rabo. Piel fina y crujiente.	Napoleón	15 Julio	Redondo algo achatado.	Septiembre-Octubre/ Marzo-Abril
<i>CEREZO BING</i>	Carne firme rojo claro, dulce y jugoso.	Van	Junio	Acorazonado grueso.	Septiembre-Octubre/ Marzo-Abril
<i>CEREZO BURLAT</i>	Carne dura y color púrpura vinoso. Piel fina y lisa.	Starking Van. Napoleón Reverchon	Mayo-Junio	Esférica. Aplanada.	Septiembre-Octubre/ Marzo-Abril
<i>CEREZO CELESTE</i>	Muy dulce. Buena consistencia y conservación.	Autopoliniza.	Junio	10 gr.	Septiembre-Octubre/ Marzo-Abril
<i>CEREZO GUINDO</i>	Rojo claro.		Junio	Medio-grueso, algo achatada.	Septiembre-Octubre/ Marzo-Abril
<i>CEREZO NAPOLEÓN</i>	Muy productiva y vigorosa. Color carmín sobre fondo claro.	Burlat. Van.	Mayo-Junio	Grueso	Septiembre-Octubre/ Marzo-Abril
<i>CEREZO STARKING</i>	Rojo brillante. Carne firme y jugosa.	Burlat. Hedelffingen.	1ª quincena Junio.	Grueso	Septiembre-Octubre/ Marzo-Abril
<i>CEREZO XAPATA</i> *	Cereza de Itxasson.		Julio.	Bueno	Septiembre-Octubre/ Marzo-Abril
<i>CIRUELO CLAUDI</i> <i>D'OULLINS</i>	Verde-amarilla.	Autopoliniza	25 Julio.	Grueso	Septiembre-Octubre/ Marzo-Abril
<i>CIRUELO CLAUDIA</i> <i>VERDE</i>	Árbol muy vigoroso y porte abierto. Sabor dulce.	Claudia oullins De la rosa C. Tolosa	15 Agosto	Medio-grueso.	Septiembre-Octubre/ Marzo-Abril
<i>CIRUELO CLAUDIA</i> <i>TOLOSA</i>	Porte abierto. Fruto verde-amarillo.	Claudia verde	15 Septiembre	Medio-grande.	Septiembre-Octubre/ Marzo-Abril
<i>CIRUELO CALIFORNIA</i>	Violeta oscuro. Árbol buen vigor.	Golden Japan Queen Rose Black ambar Larona	Finales de Julio	Redondo. Achatado.	Septiembre-Octubre/ Marzo-Abril
<i>CIRUELO GOLDEN</i> <i>JAPAN</i>	Árbol vigoroso y productivo muy abierto.	Autofértil California	Mediados de Julio	Medio	Septiembre-Octubre/ Marzo-Abril
<i>CIRUELO MARIANA</i> <i>2624</i>	Adecuado para problemas de nemátodos y armillaria.	Regular	Julio	Bueno	Septiembre-Octubre/ Marzo-Abril
<i>CIRUELO MIRABOAN</i>	El mejor para adaptarse a cualquier tipo de terreno.		Julio	Bueno	Septiembre-Octubre/ Marzo-Abril
<i>CIRUELO PORTAINJERTOS</i>	Buen vigor, producción elevada. Color violeta oscuro o rojo-negro.	Golden Japan. Queen Rose. Black Ambar. Larona.	Finales de Julio.	Redondo achatado.	Septiembre-Octubre/ Marzo-Abril
<i>CIRUELO SANTA</i> <i>ROSA</i>	Floración media.	Golden Japan Burbank	Mediados Julio.	Bueno	Septiembre-Octubre/ Marzo-Abril
<i>CIRUELO STANLEY</i>	Árbol poco exigente. Porte abierto. Excelente para pasas.	Autofértil Claudia Verde	Primeros de Septiembre.	Grueso. Ovoide.	Septiembre-Octubre/ Marzo-Abril
<i>GRANADO MOLLAR</i>	Árbol de poco porte. Prefiere suelos ligeros.		Noviembre	Aplastado. Grande.	Enero-Febrero-Marzo.
<i>HIGUERA BLANCO</i> <i>MAELLA</i>	Árbol de tardía fructificación, propio para zonas cálidas.		Octubre	Grande	Diciembre-Enero-Febrero.
<i>HIGUERA BREVA</i>	Muy rústico. Adaptable a todo tipo de suelos. Piel blanca, carne roja.		Julio	Bueno	Diciembre-Enero-Febrero.
ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	POLINIZA CON	RECOLECCIÓN	CALIBRE	PODA

ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	POLINIZA CON	RECOLECCIÓN	CALIBRE	PODA
<i>HIGUERA NAPOLITANA NEGRA</i>	Árbol de dos cosechas.		Julio y Octubre	Buen tamaño	Diciembre-Enero-Febrero.
<i>HIGUERA ROJA NAPOLITANA</i>	Piel negra y carne roja.		Agosto	Bueno	Diciembre-Enero-Febrero.
<i>KAKI ROJO BRILLANTE</i>	Color rojo butano.		Agosto	Redondo grueso.	Enero-Febrero.
<i>MANZANO SAGARRONDO</i>	COMPORTAMIENTO DE PATRONES.				
	Muy vigorosos	MM-109 MM-111 M-25	Árboles de mucho desarrollo. Acaban dando problemas de poda y recolección.		
	Muy medio	MM-106 EM-7 M-26	En general, de muy buen resultado. Se comportan bien en suelos ligeramente básicos y ácidos.		
	Muy escaso (enanizantes)	M-26 EM-27 EM-9	Arboles muy manejables. No toleran tanta arcillosidad como los anteriores.		
<i>MANZANO APEZ * SAGARRA</i>	Piel gris-rosa, carne blanca jugosa.		Septiembre	Mediana	Invierno-formación.
<i>MANZANO BELLE DE BOSKOOP</i>	Producción regular. Sabor algo ácido.		Finales de Septiembre	Bueno	Diciembre-Enero-Febrero.
<i>MANZANO BOST KANTOI</i>	Color amarillo. Sabor agridulce.		Finales de Septiembre	Bueno	Diciembre-Enero-Febrero.
<i>MANZANO FUJI</i>	Color rojo y sabor	Golden Gala.	Finales de Octubre	Grande	Diciembre-Enero-Febrero.
<i>MANZANO GOLDEN DELICIOUS</i>	Color amarillo. Gran calidad y conservación.	Autofértil. Gala. Fuji.	Octubre	Bueno	Diciembre-Enero-Febrero.
<i>MANZANO GOLDEN SUPREMA</i>	Color amarillo.	Autofértil. Gala. Fuji.	Finales de Septiembre	Bueno	Diciembre-Enero-Febrero.
<i>MANZANO GOLDEN SUPREMA</i>	Fruto verde-rosa. Carne blanca.		Octubre-Noviembre	Pequeño	Diciembre-Enero-Febrero.
<i>MANZANO GORDIN ZURIA *</i>	Fruto verde-rosa. Carne blanca.	Fuji. Gala.	Octubre	Muy grueso	Diciembre-Enero-Febrero.
<i>MANZANO PEASGOOD'S NONESUCH</i>	Árbol vigoroso. Apenas le atacan las enfermedades. Color amarillo pálido.		Primeros de Septiembre	Muy grueso. Esférico.	Diciembre-Enero-Febrero.
<i>MANZANO REINETA BLANCA</i>	Muy resistente al frío. Carne blanca, azucarada.	Reina de reinetas. Golden delicious. Starkrimson.	Septiembre	Aplastado	Diciembre-Enero-Febrero.
<i>MANZANA REINETA DE CANADÁ</i>	Vigoroso. Productivo. Sensible al chaucro.		Septiembre-Octubre	Grueso. Globoso-aplastado.	Diciembre-Enero-Febrero.
<i>MANZANO REINETA DE CAUX</i>	Sensible a la monilia y araña roja. Color amarillo-oro.		Noviembre	Grueso. Esférico-deprimido.	Diciembre-Enero-Febrero.
<i>MANZANO REINETA ENCARNA</i>	Muy productivo. Ácido.	Reina reinetas. Redchief.	Finales de Septiembre	Redondo	Diciembre-Enero-Febrero.
<i>MANZANO REINETA ENCARNADA DE ASTURIAS</i>	Fuerte vegetación. Rústico. Color rojo.		Noviembre	Mediano grueso redondeado.	Diciembre-Enero-Febrero.
<i>MANZANO REINETA GRIS</i>	Color marrón gris, áspero.	Reina reinetas. Redchief.	Finales de Septiembre	Achatados	Diciembre-Enero-Febrero.
<i>MANZANO REINETA REGIL</i>	Marrón verdoso. Piel áspera.	Claudia verde.	Octubre	Medio	Diciembre-Enero-Febrero.
<i>MANZANO REINA REINETAS</i>	Fruto amarillo pálido con algo rojo. Temprana.		Septiembre	Achatado	Diciembre-Enero-Febrero.
<i>MANZANO ROD DE BOSKOOP</i>	Color rojo un poco rayado.		Finales de Septiembre	Bueno	Diciembre-Enero-Febrero.
<i>MANZANO ROYAL GALA</i>	Color rojo estriado.	Gala Fuji	Mediados de Septiembre	Bueno	Diciembre-Enero-Febrero.
<i>MANZANO SAN JUAN *</i>	Fruto verde claro carne blanca jugosa ágrido.		Junio-Julio	Pequeño	Diciembre-Enero-Febrero.
<i>MANZANO SAN JUAN GOLDEN SUPREM</i>	Color verde rojizo.		Julio	Mediana	Diciembre-Enero-Febrero.
<i>MANZANO SIDRA</i>	Para la elaboración de sidra.		Octubre	Bueno	Diciembre-Enero-Febrero.
<i>MANZANO SIDRA * ENTZIA</i>	Fruto rojo claro. Más ácida que la apez.		Invierno	Bueno	Diciembre-Enero-Febrero.
ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	POLINIZA CON	RECOLECCIÓN	CALIBRE	PODA

ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	POLINIZA CON	RECOLECCIÓN	CALIBRE	PODA
MANZANO SIDRA * MAMULA	Fruto rojo y amarillo de gran producción.		Invierno	Bueno	Diciembre-Enero-Febrero.
MANZANO STARKING DELICIOUS	Fruto estriado en rojo.		Finales de Septiembre	Medio grande.	Diciembre-Enero-Febrero.
MANZANO TOP GALA RED	Fruto rojo agri dulce.		Septiembre	Grueso	Diciembre-Enero-Febrero.
MANZANO URTEBETE	Buen vigor. Rústico. Tendencia a la vecería. Algo sensible al chancro.		Noviembre	Mediano. Redondeado.	Diciembre-Enero-Febrero.
MANZANO USTA * GORRIA	Piel roja brillante. Carne rosada, fina, jugosa.		Octubre	Bueno	Diciembre-Enero-Febrero.
MELOCOTONERO BABY GOLD	Amarillo y rojo donde da el sol. Carne amarilla y roja hacia el interior.		Mediados de Julio	Grande	Septiembre-Octubre/ Marzo-Abril.
MELOCOTONERO CARDINAL	Epidermis roja, carne amarilla.		Mediados de Septiembre	Redondeado, grueso.	Septiembre-Octubre/ Marzo-Abril.
MELOCOTONERO SENSATION	Piel roja y carne amarilla.		Mediados de Septiembre	Grueso	Septiembre-Octubre/ Marzo-Abril.
MELOCOTONERO SUDANELL	Piel amarilla y pulpa rojiza.		Agosto-Septiembre	Grande. Redondo.	Septiembre-Octubre/ Marzo-Abril.
MEMBRILLERO DE WRANZA	Color verde limón.		Octubre	Grueso. Redondeado.	Invierno formación.
NASHI CHOJURO/HOUSHI	Verde moteado, dulce.		Agosto		Diciembre-Enero-Febrero.
NECTARINO NECTAROSS	Fruto de carne amarillenta.		Finales de Julio	Grueso	Septiembre-Octubre/ Marzo-Abril.
NECTARINO SILVER ARKINS	Fruto de carne blanca.		Finales de Agosto	Grueso	Septiembre-Octubre/ Marzo-Abril.
NÍSPERO EUROPEO	Fruto marrón de sabor ácido. Caducifolio.		Agosto	Medio	Septiembre-Octubre/ Marzo-Abril.
NOGAL COMÚN	Fruto de color marrón claro.		Septiembre-Octubre	Pequeño ovalado	Invierno formación.
NOGAL FRANQUETE	Entrada en producción al 6º año.	Harley. Neylannaise.	Octubre	Oblonga.	Invierno formación.
NOGAL HARTLEY	Más tardía que granquette (14 días). 4º año entrada producción.	Franquette.	Octubre	Cónica.	Invierno formación.
OLIVO ARBERQUÍN	Produce el mejor aceite (rendimiento 17%)		Noviembre-Diciembre	Semiglobosa.	Enero-Febrero.
PARAGUAYO	Fruto de piel rojiza.		Agosto	Aplastado	Septiembre-Octubre/ Marzo-Abril.
PERAL MADARIONDO	COMPORTAMIENTO DE PATRONES:				
	FRANCO:	Gran vigor, proporciona un sistema radicular fuerte.			
	MEMBRILLERO:	Vigor medio con raíces más superficiales y por tanto más débiles. Ahora bien, aguantan mejor la humedad. Entran antes en producción.			
PERAL BLANQUILLA	Verde lisa con chapa roja. Muy productiva. Sensible al moteado.		Agosto	Medio-grande.	Diciembre-Enero-Febrero.
PERAL CASTELLÓ PERA SAN JUAN	Fruto extratemprano color amarillo-verde rosáceo.	Ercolini. Moratini. Williams.	Julio.	Pequeño.	Diciembre-Enero-Febrero.
PERAL CONFERENCIA	Epidermis verde herrumbroso. Floración media tardía.	Autofértil Barler Williams	Septiembre	Grande alargado.	Diciembre-Enero-Febrero.
PERAL CUCHILLO	Fruto alargado verde con pecas.		Octubre	Grande	Diciembre-Enero-Febrero.
PERAL DECANA COMICIO	Fruto amarillo verdoso con lenticelas.	Conferencia Barlet	Septiembre	Grueso achatado	Diciembre-Enero-Febrero.
PERAL ERCOLINI (COSCIA)	Fruto amarillo con chapa roja. Vecero sensible al moteado.	Moretini Williams	Agosto	Medio	Diciembre-Enero-Febrero.
PERAL IMPERIAL	Para cocción, o compota, sabor amargo.		Finales de Octubre.	Muy grueso	Diciembre-Enero-Febrero.
PERAL MANTECA ARENBERG	Fruto verde amarillento de carne blanca. Algo sensible al moteado.		Noviembre	Grueso oblongo.	Diciembre-Enero-Febrero.
PERAL MANTECA HARDY	Buena producción a partir del 4º 5º año. Fruto marrón, áspero.	Williams Conferencia	Mediados de Septiembre.	Medio	Diciembre-Enero-Febrero.
PERAL PASSA CRASSANA	Muy productiva y buena conservación.	Williams Conferencia	Octubre	Muy grande	Diciembre-Enero-Febrero.
PERAL TENDRAL DE VALENCIA	Buen vigor. Brotación vertical. Fruto amarillo claro.	De Comicio Williams	Agosto	Pequeño	Diciembre-Enero-Febrero.
PERAL WILLIAMS	Buena producción. Vigor moderado.		Agosto	Grande	Diciembre-Enero-Febrero.
ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	POLINIZA CON	RECOLECCIÓN	CALIBRE	PODA

ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	RECOLECCIÓN	PODA
<i>VID ALFONSO LAVALLE</i>	Uva de forma ovalada, negra. Calibre grueso.	Septiembre	Noviembre-Diciembre.
<i>VID CARDINAL</i>	Uva roja de grano gruesa. Muy comercial. De mesa. Calibre grueso.	Agosto	Noviembre-Diciembre.
<i>VID CAVERNET SOUVIGNON</i>	Uva negra.	Septiembre-Octubre.	Noviembre-Diciembre.
<i>VID GARNACHA</i>	Variedad para vinificación. Uva negra.	Septiembre-Octubre.	Noviembre-Diciembre.
<i>VID MOSCATEL NEGRO HAMBURGO</i>	Uva negra. Sabor moscatel. Calibre grueso.	Septiembre	Noviembre-Diciembre.
<i>VID MOSCATEL ROSAKI-ROMANO</i>	Uva amarilla. De mesa. Calibre grueso.	Agosto-Septiembre.	Noviembre-Diciembre.
<i>VID TEMPRANILLO</i>	Uva negra.	Septiembre-Octubre.	Noviembre-Diciembre.
* variedades autóctonas.			
CÍTRICOS	Frutales de hoja perenne. En nuestro litoral aconsejamos plantarlos orientados de forma protegida (S, SE, E). Son sensibles a las heladas.		
	Portainjertos más utilizados: Citrange Carrizo, Mandarino Cleopatra, Naranja dulce, Naranja amargo, Citrus Macrophylla.		
	Variedades más utilizadas en nuestro litoral:	<i>NARANJO</i>	<i>Valencia LATE</i> . Maduración Abril-Mayo. Muy productivo. <i>NAVEL</i> . Maduración Noviembre. <i>NAVELINA</i> . Maduración OCTUBRE. Buen tamaño.
		<i>MANDARINO</i>	<i>CLEMENULES</i> . Maduración Noviembre-Enero. Muy productivo y tamaño bueno.
		<i>LIMONERO</i>	<i>EUREKA</i> : Vigor medio. Muy productivo. Madura durante TODO EL AÑO. Fruto grueso. <i>VERNA</i> : Maduración Primavera-Verano. Tamaño de fruto mediano.
	<i>POMELO</i>	<i>MARSH</i> . Maduración Noviembre-Enero. Fruto grueso y sin semillas. Pulpa amarilla. <i>RED BLUSH</i> . Maduración Octubre-Enero. Fruto mediano con pulpa rosada.	
ARBUSTOS PEQUEÑOS FRUTOS	<i>GROSELLERO ROJO</i> <i>Ribes Rubrum</i> <i>ANDERÉ MAHATZ GORRI</i>	Arbusto de 1 a 1,5m. Caduco-Autofértil. Emplazamiento: sol. Frutos sabrosos utilizados para hacer mermelada. Maduración: Agosto a Octubre.	
	<i>GROSELLERO NEGRO</i> <i>Ribes Nigrum</i> <i>ANDERÉ MAHATZ BELTZ</i>	Arbusto de 1 a 1,5m. Caduco-Autofértil. Frutos sabrosos utilizados para hacer mermeladas. Maduración: Agosto a Octubre.	
	<i>GROSELLERO BLANCO</i> <i>Uva Crispa-Agrazon</i> <i>RIVES GROSÜLLARIA ARAKATZ</i>	Tiene espinas pero su fruto es grueso. Autofértil. De hoja caduca. Maduración: Agosto a Octubre.	
	<i>FRAMBUESO ROJO</i> <i>Rubus Idaeus</i> <i>MUGURDIONDO GORRI</i>	Espinoso arbusto de 1 a 1,5m. Autofértil. Quiere terrenos orgánicos, frescos, drenados y húmedos. Resistente al frío y de hoja caduca. Permite formación en espaldera. Maduración: Agosto a Oct.-Noviembre.	
	<i>FRAMBUESO NEGRO</i> <i>Rubus Idaeus</i> <i>MUGURDIONDO BELTZ</i>	Mismas características que el anterior. Autofértil. Ramifica desde el suelo y le conviene formación en espaldera. Maduración: Agosto a Oct.-Noviembre.	
	<i>ENDRINO</i> <i>Prunus Espinoso</i> <i>ELORRI BELTZ</i>	Arbusto rústico de hasta 2m, que posee pinchos. Autofértil. Es de hoja caduca y además se utilizan sus frutos para hacer licores, es una planta ideal para hacer cierres de terreno. Maduración: Septiembre a Oct.-Noviembre.	
	<i>ARÁNDANO</i> <i>Vaccinum spp.</i> <i>AHABI</i>	Arbusto fuerte de hasta 30 ó 80cm. Resistente al frío. Autofértil. Sus frutos se utilizan para hacer mermeladas. Se adecua al sol y a la semisombra. Maduración: Septiembre a Noviembre.	
	<i>ZARZA-MORA</i> <i>Rubus Fruticosus</i> <i>MASUSTA</i>	Planta con espinas. Autofértil. Muy rústica y poco exigente, suelos compactos. De muy extenso desarrollo y producción. Fruto negro brillante. Maduración: Septiembre a Noviembre.	
<i>ZARZA TERREÑA</i> <i>Rubus Fruticosus</i> <i>ZORAMUSTA</i>	Planta sin espinas. Autofértil. Muy rústica y poco exigente, suelos compactos. Fruto negro azulado utilizado para licores. Maduración: Septiembre a Noviembre.		

* Si lo desea, pídanos información sobre variedades de frutales autóctonos procedentes de Iparralde.

