

Guía de tratamientos recomendados para manzanos, 2008

Estado fenológico	Plaga o enfermedad	Insecticida o Fungicida	Producto comercial	Observaciones
A	Pulgonos / Araña roja	Aceite de invierno	Varios	
A-B	Moteado / Chancros	Cobre	Varios	
C-D	Moteado / Chancros	Cobre (mitad dosis)	Varios	
	Araña roja	Hexitiazox	Zeldox	No controla adultos. Realizar un solo tratamiento al año.
	Pulgones	Imidacloprid	Confidor 25LS	Se puede aplicar por riego localizado.
G	Moteado y Oidio	Grupo M.O. : fungicidas con efecto antimoteado y antioidio de carácter curativo.		Tipo de acción penetrantes o sistémicos. En el caso del moteado impiden la progresión del hongo en las 36-72 horas siguientes al comienzo de la lluvia. <u>Alternar</u> el uso de los fungicidas de distintas familias para evitar resistencias: * Triazoles : inhibidores de la biosíntesis del ergosterol (I.B.E). ** Estrobirulinas : inhibidores de la respiración mitocondrial.
		Bitertanol* Ciproconazol* Diniconazol* Fluquinconazol* Flusilazol* Hexaconazol* Kresoxin metil** Miclobutanil* Tebuconazol* Tetraconazol* Trifloxistrobin**	Baycor 25 PM* Caddy 10 Pepite, Ateni 5 LS* Sumiocho 12,5 PM* Castelan* Nustar 40EC* Anvil SC* Stroby** Systhane forte* Folicur 25WG* Emerald* Flint**	
	Monilia	Grupo MON.: fungicidas con efecto antimonilia.		
		Iprodiona Metil tiofanato	Rovral aquaflo Topsin 70 WG	
	Pulgones	Imidacloprid* Pirimicarb	Confidor 20LS* Aphox	* Se puede aplicar por riego localizado.
+12 días	Moteado y oidio	Fungicidas con efecto antimoteado y antioidio de carácter curativo (elegir un formulado del grupo M.O.).		
+12 días	Moteado y oidio	Fungicidas con efecto antimoteado y antioidio de carácter curativo (elegir un formulado del grupo M.O.).		
+12 días	Moteado y oidio	Fungicidas con efecto antimoteado y antioidio de carácter curativo (elegir un formulado del grupo M.O.).		
A partir del cuajado del fruto SEGÚN CAPTURAS EN TRAMPAS.	Agusanado Avisos en telef. 944066879	Diflubenzuron Flufenoxuron Tebufenocida Teflubenzuron Tiacloprid*	Dimilin25, Kitinex25PM, Progerm Cascade Mímico 2F Dart, Nomolt Calypso*	*Efecto contra pulgonos.
A lo largo del periodo vegetativo SEGÚN CONTEOS.	Araña roja Avisos en telef. 944066879	Fenazaquin Fenpiroximato Tebufenpirad	Magíster flow Flash Comanche plus	Realizar máximo un tratamiento al año con cada producto para evitar resistencias.
Engrosamiento de frutos - Maduración	Monilia	Fungicidas con efecto antimonilia (elegir un formulado del grupo MON.).		
	Moteado	Grupo MOT. : fungicidas con efecto antimoteado de carácter de "stop".		Tipo de acción penetrante. Realizar el tratamiento en las 36 horas posteriores al comienzo de las lluvias.
	Clortalonil Ditianona Dodina	Daconil 50 SC, Bravo 50 Delan Melprex 65 PM		
50% Caída de hojas	Moteado	Cobre + Urea	Varios	Dosis general: 1 kg de cobre y 10 kg de urea del 46% por 100 litros de caldo